Nota sobre una especie del género *Thiodina* Simon, 1900

(Araneae, Salticidae)

Por MARIA ELENA GALIANO

En el trabajo que bajo el título "Una nueva especie del género *Thiodina* Simon, 1900" publiqué en esta misma Revista, en el volumen XIX, en la página 58, las líneas 29 a 44, por un error de imprenta han salido mezcladas. Por eso deben sustituirse por las siguientes:

Espinas de las patas del Holotypus macho.

Patas:

Pata I: Fémur: 1-1-1 espinas dorsales, 2 apicales prolaterales y 1 apical retrolateral. Patella 1 prolateral y 1 retrolateral. Tibia 2-2 ventrales y 2-2 cerdas bulbosas en la mitad basal. Protarso 2-2 ventrales. Toda la pata color castaño oscuro, en algunas zonas más claro; el tarso amarillo.

Pata II: Fémur: 1-1-1 espinas dorsales, 1-2 prolaterales (las últimas apicales) y 1 apical retrolateral. Patella 1 prolateral y 1 retrolateral. Tibia de la pata izquierda 2-2-2 ventrales. Los dos últimos pares están alejados hacia el ápice y en el espacio que queda entre el primero y el segundo par, hay una espina media ventral. La tibia de la pata derecha tiene 1 espina media ventral en lugar del par basal, 1-1 prolaterales. Protarso 2-2 ventrales. Colorido semejante a la pata I, pero más claro.

Pata III: Fémur: igual que la pata II. Patella de la pata izquierda 2 prolaterales y 1 retrolateral. Patella de la pata derecha 1 prolateral y 1 retrolateral. Tibia 2-2 ventrales, 1-1-1 prolaterales y 1-1-1 retrolaterales, 1 dorsal basal. Protarso 2-2 ventrales, 1-2 prolaterales y 1-2 retrolaterales, formando un verticilo apical de 6 espinas. Fémur amarillo, con un ancho anillo apical negro. Patella y tibia castaño claro. Protarso y tarso, amarillos.

Pata IV: Fémur 1-1-1 espinas dorsales, 2 apicales prolaterales y 2 apicales retrolaterales. Patella 1 prolateral y 1 retrolateral. Tibia 1p-2 ventrales, 1-1-1 prolaterales y 1-1-1 retrolaterales, 1 dorsal basal. Protarso 1p-2 ventrales, 1-1-2 prolaterales y 1-1-2 retrolaterales formando un verticilo apical de 6 espinas. Colorido igual que en la pata III.